

Памятка по профилактике заболевания африканской чумой свиней

Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью летальности пораженных животных и высоким экономическим ущербом. АЧС – опасности для жизни и здоровья людей не представляет.

Источники возбудителя болезни

Главный источник инфекции – больные и павшие свиньи. Переболевшие животные остаются длительное время носителями и выделителями вируса. Вирусоносительство у отдельных животных длится до 2 лет и более. Из организма зараженных животных вирус выделяется с кровью при носовом и других видах кровотечениями, фекалиями, мочой, секретами слизистых оболочек носовой полости, слюной. Животные заражаются при поедании кормов, пораженных вирусом, респираторным путем, через поврежденную кожу и укусы зараженных клещей. Вирус распространяется зараженными животными-вирусносителями, в том числе находящимися в инкубационном периоде, а также через различные инфицированные объекты. Особую опасность представляют продукты убоя зараженных свиней (мясо, мясопродукты, сало, кровь, кости, шкуры и др.)

Инфицированные вирусом пищевые и боенские отходы, используемые для кормления свиней без тщательной проварки – основная причина заражения свиней африканской чумой. Отмечены неоднократные случаи распространения инфекции с продуктами питания при выезде частных лиц из районов, где регистрировалось заболевание.

Устойчивость вируса АЧС

Вирус АЧС устойчив в широком диапазоне температур и рН среды, включая высушивание, замораживание и гниение. Он может оставаться жизнеспособным в течение длительного времени в фекалиях, крови, почве, и на различных поверхностях – деревянных, металлических, кирпичных. В трупах свиней инактивируется не раньше чем через 2,5 месяца, в кале в течение 160 дней, в почве – за 190 дней, а в холодильнике при минус 30-60⁰ – от 6 до 10 лет. В мясе инфицированных свиней и копченых окороках он сохраняется 5-6 месяцев.

Течение и симптомы заболевания

Инкубационный период заболевания может продолжаться от 2 до 6 суток. Различают сверхострое, острое, подострое, хроническое и латентное течение болезни. Чаще наблюдают сверхострое и острое течение болезни. При *сверхостром* течении температура тела у больного животного повышается до 40,5-42⁰С, сильно выражены угнетение и одышка. Животное больше лежит, а через 24-72 часа погибает.

При *остром* (наиболее характерном) течении болезни температура повышается до 40,5-42⁰С, подавленное состояние, парез задних конечностей, цианозные красно-фиолетовые пятна на коже ушей, рыла, брюха, промежности и нижней части шеи, проявляются признаки воспаления легких. В агональной стадии болезни животные находятся в коматозном состоянии, которое продолжается 24-48 часов, температура тела снижается ниже нормы и животное гибнет через 4-10 дней.

Лечение и профилактика

Вакцины против АЧС до настоящего времени не разработано, лечение запрещено. В случае появления очага инфекции больное свиноголовье уничтожается бескровным методом, а все остальные свиньи в очаге и радиусе 20км от него ликвидируются. Больные и контактировавшие с больными животными свиньи подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

Владельцам животных содержащих свиней на личных подворьях необходимо соблюдать следующие правила, выполнение которых позволит предотвратить заражение животных и избежать экономических потерь

- Обеспечить безвыгульное содержание свиней в личных подсобных хозяйствах.
- Регулярно предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций против классической чумы свиней и рожи.
- Проводить ежедневный осмотр свиней и при подозрении на заболевание или в случаях падежа немедленно сообщить в ветеринарную службу по телефонам: 5-33-74, 5-25-73
- Не использовать для кормления животных пищевые отходы из мест общественного питания, не прошедших термическую обработку – проварку при температуре не менее 70⁰С в течении 30 минут.
- Не приобретать свиней и корма без ветеринарного сопроводительного документа установленной формы, подтверждающего благополучие местности по инфекционным болезням животных.
- Уничтожать грызунов и кровососущих насекомых в личном подворье.
- Не проводить убой животных без осмотра ветеринарным специалистом и без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя.
- Во избежание заражения не покупать у случайных людей (в не санкционированных местах торговли) мяса, продуктов убоя, готовой продукции из мяса свиней

Помните!

Выполнение Вами этих правил позволит избежать заноса африканской чумы свиней на территорию Ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит значительные экономические убытки.